

**Mémoire, y compris stage professionnalisant[BR]- Séminaires méthodologiques intégratifs[BR]- Mémoire : "Quels sont les facteurs influençant l'adhésion thérapeutique chez les femmes en âge de procréer et souffrant d'endométriose en Province de Liège? "**

**Auteur :** Buelens, Gloria

**Promoteur(s) :** ROUSSEAU, Laetitia

**Faculté :** Faculté de Médecine

**Diplôme :** Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée en praticien spécialisé de santé publique

**Année académique :** 2024-2025

**URI/URL :** <http://hdl.handle.net/2268.2/22607>

---

*Avertissement à l'attention des usagers :*

*Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.*

*Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.*

---

# « Quels sont les facteurs influençant l'adhésion thérapeutique chez les femmes en âge de procréer et souffrant d'endométriose en Province de Liège ? » Buelens Gloria

## Errata

### Page 25 - Tableau 1 Statistique descriptive : caractéristiques de l'échantillon :

- Ligne 12 intitulée « Traitement » : remplacer « traitement » par « Prise d'un traitement »
- Ligne 13 intitulée « type 2 » : remplacer « type 2 » par « Type de traitement »
- Ligne 14 intitulée « prise d'un traitement » : supprimer la ligne dans son intégralité

Le tableau corrigé est repris en page 2 de ce document

### Page 29 – Les deux premières phrases du texte :

- Première phrase :
  - o remplacer « deux » par « trois »
  - o ajouter « , « chirurgie » entre « type d'endométriose » et « et « prise en charge pluridisciplinaire » ».
- Deuxième phrase : remplacer « deux » par « trois »

Les phrases modifiées deviennent : « La régression logistique automatique de type Forward a retenu trois variables, « type d'endométriose », « chirurgie » et « prise en charge pluridisciplinaire ». Ces trois variables ont un OR inférieur à 1, réduisant la probabilité de la variable d'intérêt, à savoir la « bonne observance thérapeutique ».

### Page 32 – L'avant dernière phrase du texte :

- Remplacer « travaillent » par « travaille »

Remplacer « soient » par « soit »

La phrase corrigée devient : « Nous ne pouvons pas exclure qu'une majorité des participantes travaille en milieu hospitalier ou soit infirmière. ».

Tableau 1 Statistique descriptive : caractéristiques de l'échantillon

Variables		n=39	Moyennes
<b>Âge (années)</b>			34,36 (29,50-40)
<b>Profession</b>	sans activité professionnelle avec activité professionnelle maladie	5 (12,82%) 30 (76,92%) 4 (10,26%)	
<b>Etude</b>	Primaire ou secondaire bachelier master	11 (28,21%) 23 (58,97%) 5 (12,82%)	
<b>Civil</b>	Célibataire cohabitante ou mariée séparée ou divorcée	13 (33,33%) 24 (61,54%) 2 (5,13%)	
<b>Composition</b>	Avec enfants Sans enfant	19 (48,72%) 20 (51,28%)	
<b>Connaissance endo</b>	De 1 à 2 = faible 3 = moyen De 4 à 5 = élevé	5 (12,82%) 9 (23,08%) 25 (64,10%)	
<b>Informations reçues</b>	De 1 à 2 = faible 3 = moyen De 4 à 5 = élevé	13 (33,33%) 14 (35,90%) 12 (30,77%)	
<b>Soutien</b>	De 1 à 2 = faible 3 = moyen De 4 à 5 = élevé	16 (41,03%) 5 (12,82%) 18 (46,15%)	
<b>Type</b>	endométriose profonde endométriose superficielle endométriose ovarienne	34 (87,18%) 5 (12,82%) 0 (0%)	
<b>Délai</b>	Moins de 3 ans De 3 ans à 6 ans Plus de 6 ans	12 (30,77%) 8 (20,51%) 19 (48,72%)	
<b>Prise d'un traitement</b>	0 = non 1 = oui	18 (46,15%) 21 (53,85%)	
<b>Type de traitement</b>	Progestatif oestroprogestatif microprogestatif antagoniste autre traitement ou aucun traitement	12 (30,77%) 2 (5,13%) 2 (5,13%) 5 (12,82%) 18 (46,15%)	
<b>Nombre traitements (en nombre)</b>			3,50 (1,00-4,00)
<b>Chirurgie (en nombre)</b>	Avec chirurgie Sans chirurgie	22(56,41%) 17 (43,60%)	0,82 (0,00-1,00)
<b>Consultation</b>	cabinet privé gynécologie centre	14 (35,90%) 14 (35,90%) 11 (28,21%)	
<b>Pluri</b>	Oui non je ne sais pas	12 (30,77%) 16 (41,03%) 11 (28,21%)	
<b>Région</b>	région flamande région bruxelloise région wallonne	0 (0%) 0 (0%) 39 (100%)	